

# FAVISM

## فاویسم یا کمبود آنزیم

## G6PD (بیماری باقلا)

### تعریف :

یک بیماری ارثی است که به شکل کم خونی و بیشتر در اثر خوردن باقلا و یا در اثر مصرف برخی داروهای اکسید کننده در افراد مبتلا اتفاق می افتد . حتی گاهی اوقات لمس کردن باقلا یا قرار گرفتن در معرض بوی آن در خیلی از کودکان علائم بیماری ظاهر می شود :

فاویسم اگرچه یک مشکل حاد پزشکی قلمداد نمی شود ، ولی آگاهی دادن به والدین در مورد بیماری و علائم آن بسیار ضروری است

### علت بیماری:

این بیماری عارضه ای است که به خاطر کمبود یک نوع آنزیم در گلبول قرمز خون به دنبال تماس با پاره ای مواد و یا داروها ممکن است در فرد مبتلا بروز کند و گلبول قرمز همولیز یا شکسته شود .

### علائم:

بی حالی ، رنگ پریدگی ، زردی سفیدی چشم ، زردی پوست و خونی شدن رنگ ادرار و کم خونی می باشند .  
در دوران نوزادی علائم آن بیشتر به صورت زردی شدید می باشد که می تواند تنها نشانه ی این عارضه باشد ممکن است منجر به تعویض خون نوزاد شود .



### شناسنامه

منبع:	طب کودکان نلسون
تهیه کننده:	ولעד آموزش به بیمار
تاریخ بازنگری:	بهار ۱۴۰۰
تاریخ اعتبار:	دو سال
تایید کننده:	مسئول علمی بخش

### ارتباط با ما:

شماره تماس:

071-2279701-9

داخلی:.....

وبسایت:

<http://shirazmch.ir>

ایمیل:

[motherhosp@gmail.com](mailto:motherhosp@gmail.com)



بیمارستان فوق تخصصی مادر و کودک غدیر  
GHADIR MOTHER & CHILD HOSPITAL

## جهت کودکان مبتلا به فاویسم ، رعایت نکات زیر

### الزامی است :

- اگر مادری هستید که کودکان را شیر می دهید ، هرگز باقلا و آسپرین نخورید و در مورد خوردن هر دارویی با پزشک مشورت کنید .
- فرزندانتان باید از خوردن و بوییدن باقلا به هر صورت که باشد ( تازه ، خشک شده ، یخ زده ، خام یا پخته ) خودداری کند .
- برای بید زدایی لباس های کودک از نفتالین استفاده نکنید و مراقب باشید بوی نفتالین به مشام او نرسد .
- در اتاق یا محل زندگی او از اسپری های حشره کش استفاده نکنید .
- برای تسکین درد یا پایین آوردن تب هرگز به او آسپرین ندهید .
- فرزند شما نمی تواند و نباید خون را به دیگران اهدا کند .
- در صورت مشاهده ی رنگ پریدگی شدید همراه تب و استفراغ و تیره شدن رنگ ادرار فوراً پزشک را آگاه سازید .
- هنگام مراجعه به پزشک اطلاع دهید که کودکان مبتلا به فاویسم است . داروهای اکسیدان مثل آسپرین ، استامینوفن با دوز بالا ، ویتامین K و ویتامین ث ، داروهای ضد مالاریا ، مصرف نفتالین و حنا و مصرف بعضی از آنتی بیوتیک ها در این بیماری ممنوع است و جهت مصرف هر دارویی باید با پزشک مشورت کنید .

